## D. O. M.

## QUÆSTIO MEDICO-CHIRURGICA,

QUODLIBETARIIS DISPUTATIONIBUS, manè difcurienda in Scholis Medicorum, die Martis, decimà-quintà mensis Martii anni M. DCC. XLVI.

## M. CLAUDIO BOURDIER DE LA MOULLIERE, Doctore Medico, Prasside.

An , ingruente in artus Gangranâ à causâ internâ , amputatio imperanda ?

I,



TATUTUM manet vitam & Gnitatem pofitam in libero fanguinis circuita; in eoque conferando aut refittuendo totum Medica artis uninferrum. Sed quam longè lateque diffufa circulationis fanguinis notitina, quam vaftum Medici dominiuni, non folum infersa se indole & more fuidorum que folidas parete alluunt moventque, fed perfufira arteriarum & venarum propagines, gyros & divariactiones, divertium vifereum se mucilculorum contextum, membranarum expansiones, nervorum furculos, omniumque partium mollium coalitum & appensirum offluinu duratiem, jaguran, diamertum, pofitionem, connectionem

divariationes, diventum viacetum as mutanotum consecutin, pro-essentium expansiones, pervorum futcules, omniumque partium mollum coalicium & expansiones, pervorum futcules, omniumque partium mollum coalicium & competentum olium duritiem, figuram, diametrum, positionem, concecionem virum imperium fish Medican vindicat. Hae, not diversionem objectionem accompetential diametrial processor diametrial processor diametrial processor diametrial processor diametrial processor diametrial processor diversionem infettumentorium quibus utitut confervands aut restructed propont; rutifugue, ratione diversionem infettumentorium quibus utitut confervands aut restructed finalizatione finalizatione diversionem infettumentorium quibus utitut confervands aut restructed finalizatione finalization

S ANGUI S er fishfamti rubta, globulo i, biloß & lymphuici coalefens, quique puttes ad mutam connexionem minturu ; leni frementationis mout, cordicius contractione, ac foli-dorum tritu & affindu fluidiratem tucutu, ac circutum fuum per arterias & venas, indefinence Peragir. Non in fluidi motu, noc fermentationis, confilir vitalis motus, fed in proprefilonis motu, quo finguis ab extremis arteriis transit in venas, quo partes quacumque corporis nutriuntur, morturu, fencionis, functiones funcas excercent, communique vita fruuturu, reparatur ac confervantur, fine fearuriens lympha per via lymphare ubique himain feceriniur, nutriendis partibus concerdata, quint inpettes in fanguinis alevam reductur. Hoc impulsionis motu, anguis per arterias fina, quint inpettes in fanguinis alevam reductur. Hoc impulsionis motu, anguis per arterias fina, quint inpette sin fanguis expensival expensival propressival descriptions and anguis expensival propressival for the fanguis expensival propressival expensival propressival propressival expensival propressival expensival propressival propressival expensival propressival propres

19.



& ervlivelas omnesque tumores inflammatorii, hos comitatur doloris & caloris & pulsationis sensus cum rubore intento, vigilià, anxietate, ac petsapè febre, quæ symptomata parit sanguinis stagnatio, quâ tenduntur ac divelluntur fibra nervea, à nisu aut resultione sanguines coacti ad latera arteriarum capillarium, ob obices adverfantes motui progreflivo fanguinis; hinc pulfario ab arteriarum motu adaucto, renitente obstructione salienti sanguini, vincendæ resistentiæ impari, hincsystaltico fibrarum motu; tensione atque subsultu, nervorum ac spirituum animalium commotione ac arteriarum vibratione morantis in interfeniis fanguinis attritio ac fermentatio major, unde caloris fensus tumoris intensior cum rubore suffuso, astusque febrilis & agritado corporis; Lympha similiter ad motum inertior in valis lymphaticis aut glandulis hotens pone fequenti obices ponit, fluentique alveo vias intercludit, laxataque fibrarum congeries continuo lymphæ morantis appulfu, in tumorem mollem & pallidum accrescit; hinc cedemata enascuntur. Eâdem lymphâ in vasis staguante, secusius phlegmatis denfiore facta, tumor durus & indolens, tactui renitees & schirrhus protuberat, rursus lympha alibilis craffior ad falfum-acidum aut falfum-acre vergens non concreteit nec aglutinatur nutriendis partibus, sed fibrarum contextum ro 'endo, continui solutionem properat ac mortificationen inducit, mag's in partibus nervosis, glandulosis, adiposis actendineis ob tardiorem fluidi motum, quam in fanguineis; hinc carbunculi & bubones vitio lymph & fanguinis fobole cunt; tumores lymphaticos & fanguineos à lymphæ & fanguinis stagnantis labe, comitari soletGangræna ut & à vitio partium folidarum; circuitus fanguinis & lympha impeditur contufionibus, luxationibus, offium fracturis & carie, vulneribus & venenatorum animalium morfu; quibufcumque caufis vafa fanguinea & lymphatica aut comprimuntur aut aperiuntur, ipforumque diameter imminuitur, quibus omnibus fanguis aut hoeret in valis aut extra vala effunditur & congeritur & putrefactionem contrabit extincto c ilore nativo & abolità contractione arteriarum capillarium, motuque syltaltico omnium fibrarum farifcente; hinc floridus partis color nativus plus au: minus intenfus mutatus in pallidum obfcurum fublividescentem aut caruleum in nigredinem definens; hinc sub colorum mutat ontbus caro mox tensa, nunc mollis & flaccida, quali omni tono & elatere destituta evadit, cuti que sejungitur & aqua decolor tetri odoris effluere folet, hinc tactus fenfatio, dolorque primum acerbus ab exusid inte primum fanguine, divulsoque fibrarum nervearum contextu, imminuto gradati.n fractoque earum tono paulatim evanescit, delitescensque magis ac magis fibrarum textura & una cum sanguine in diffolutionem facilicens, pars ante calida friget, odoremque cadaverofum spirat; hinc sanguis perpetuo à corde propulsus ad partem Gangræna correptam de motu suo deperdit, nec stagnantem ac concretum refolvere potelt, nec corruptum foras expellere, ipfeque remorando aut tarde progrediendo intra collaterales arterias, eandem labem contralir, partiunque corrupti jam fangunis effluvio inficitur; citoque malum ferpendo per cmina vala disfundier, ac circuitus ejus permitis aboletur, nifi Sphacelara part maturo feeccur, infialque fanguni abbes corrig tura e deleatur, feed quantum bonis agri reduo Sphacelatz partis amputatione, opportune celebrată, auteri potest causa morbi in vitio locali ab extraneis corporibus oborto, tantum desperanda falus eorum, quos ab intemp rie fanguinis, Gangrana corrumpit; in hoc deplorato cafu incafsum dolores & cruciatus agrotans patitur ac omni peririâ facta operatio artis dedecori vertitur, que in Sphacelo ab externa causa felicem fuccessum habere posset-

III. E X P E R I E N T I A conftat fanguinem etiam laudabilem & exquifitæ indolis in vafis congettum & affervatum puttefeere & fphacelum adducere, quod probatur exemplo ligaturæ fortioris qua venis brachii & pedis arcte compressis, progressus sanguinis inhibetur & in vasis stagnans mortificationem inducir, unde patet fanguinem nulla fup; ofita labe folaque remera ac fecto circulationis filo mutată figură mole & politură partium componentium ad dissolutionem corruptivam vergere una cum valis sanguineis sibrisque carneis, tendineis ac nerveis; hinc sanguis si vitio partis seu remisso fibrarum elatere ut in paralyli quandoque contingit seu à contundentibus aut comprimentibus divellentibus aut scindentibus corporibus in valis moram trahat, aut extra vala estundatur, eadem puttedine labefactatur; fed putredinis fons & origo supponitur vitium illud locale partique inharens ex inflicto vulnere quo difruptæ arteriæ hiant vel in cavitatem vel intra fibrarum interstitia, nec venarum oscula fanguis subire potest. Ergo nonnisi partis resectione stagoans & putrefactus sanguis auferti potest. caufa morbi, vitaque fervari ; amputatione enim opportuno tempore factà & priufquam fanguis cor rupri humoris contagio inquinetur, viget & arteriarum elater, fanguinique progressivus motus 3 corde quo resectorum vasorum fibr...rumque vulneris labia ad suppurationem laudabilem adduci posfunt; sanguisque fincerus ad vulnus appellit, lymphâ fluidâ ac subdulci contextum vasorum irrigans; ac extremis vaforum & fibrarum finibus concrefcunt novæ carnes & efflorescunt codem moru quo prifting in suppurationem veniunt, &Escharam expellunt; sicarteriarum extrema cum venis mutuo hiatu coalescunt ac impeditus sanguinis circuitus restituitur; secus verò in parte sphacelarà á causa internâ seu ab intemperie sanguinis quâ tumores inslammatorii & lymphatici generantur, quâ ve sanguis & lymphi in valis herent & stagnant, nec nisi peragrè circuitum suum abs lyunt : amputatione etiam perite administrata non tollitur causa morbi efficiens, sed productum morbosum; nec enim emundatur fanguinis intemperies, nec pr. va corrigitur illius crafis, fed & falledinem & acris moniam ant aciditatem & crafficiem eandem fovet, vitium que fanguini inhærens non delebitur amputato femore, crure aut brachio fphacelato, & qua labe fanguini inuftà vaforum & fibratum congeries una cum humoribus in putredinem decidit, eadem graffante, fanguis vitali motu privabltur, quin & dolorificis nervofarum partium divulfionibus & inordinatis ac vehementibus spirituum animalium motibus fanguis incandefeit, febrique exardefeit, & tam volatilium partium diffipation ne, quam moru febrili intenditur & accrefcit fanguinis intemperies, qua nec vulnus ad suppuration nem perduci pocelt, nec vulnetis labia novo lympha alibilis ádventu agglutinari, nec ad cicatricem farmam pervenire; fic lympha acrior ab amputatione fachá aut crallior, vel non pervadet olitiola partium nutriendarum neque concrecte estami fibirs, vel falidente fuix à carimonia abriedat ipacum texturam, fanguique effectus magis ac magis lentefet in valis, donec collabeite mout cortes, pien influsiva arreitofis hereat, a cputredinalem fermentanionem fulcipitar, interactoque circulationis filo, mors, fiphacelate partis amputatione, Arris Medica detrimento ac dedecore acceleretur. I. V.

T rubra fanguinis pars per se fermentescens, à corde velut Embolo truditur intra arterias & venas, iphufque vis motiva bafi coni fanguinis arteriofi admovetur, & motus illius progreffivus arteriarum contractione perpetuâ tovetur, fic lympha vas rum lymphaticorum ad fermentationem inertior, facilius & citius hæret in partibus membranofis. Hinc Gangræna frequentius membranofas partes obsidet quam sanguineas, difficiliusque curatur in illis quam in sanguineis que caloris motum diutius conservant, sopitumque recuperant, tantò enim facilius resolvi potest Coagulatus & concretus sanguis in arteriis extremis, tûm impulivo cordis motu, tûm arteriarum contractione, ac sanguinis sermentatione, quanto disticilius resolvi porest lympha lymphaticorum ad morum segnior & slagnans in partibus membranosis diltansque a vasis sanguiferis, hinc fracturæ Prope articulos Gangrænæ incurabilis pessimum omen portendunt, artusque recisionem accelerare debent; hinc tumores partibus adipolis adnascentes citius aperiendi, ne lympha crassior in veficulis adipolis congesta in cadaverosam putredinem abeat priusquam tumor mollitiem acquirat. Inter memoratas caufas Gangrana externas, locum habent topica remedia incaute tumoribus admora, ut vesicatoria tumoribus cedematosis aut unguenta, pinguia, obstituentia, aut adstringentia, frigida, tumoribus fanguineis, ut eryfipelati, qua fanguinis morum in parte coercent & fufflaminant. In caufarum Gangrana internarum actione immorari non licet : quacumque fanguinem aut plus aquo agitare valeant, aut illius motum progressivum spissando obtundere, peraque siet statis & Just acquo in gatar va laine, see talinus mortum progremivum i puntato un esta si intemperies, fubitanez musiliagnato in valis ji commer see ar micelà halituum quorumque quos ex note della mortum que quos ex note inhende eximpira, quive halitum air ex micelà halituum quorumque quos ex note inhende eximpira, quive halitum air qui viriolice, indols, feu liquime tota deris vehiculo fanguini in pulmoribus amilantur, air pinie que coagulant vel fermentando colliquam & actimoniam fallam pulmoribus caminamican, ripinie que fecto per fulle intende & Gangeronde ex va porrobus Nili in Agypo graffantur: Easidem noxas patitur corpus ab inclementia, incumbentis acris qua sanguis subito spissatur in vasis minimis habi um corporis perreptantibus flante Aquilone quo supprimitur transpiratio, unde lym-Phatici tumores oriuntur; ficut tumores sanguinei ab æstu aeris corporis kabitum ambientis, quo languis exardescit; aer diversimode & ut causa externa, artus corporis afficit frigore acuto, dum Gangræna pedes viatorum invadit in regionibus septentrionalibus, à coagulato sanguine quæ nivis affrictu refolvitur, & curatur; in genere humorum quorumlibet stagnantium acrimonia, aut aciditas fi-Titate concretione, & acutie falium, vafa & fil ras exedendo, & destruendo liquida, ad instar aquarum ftygiarum Gangrænam advocat, sive à sero sanguinis in aliqua parte, aut cavitate coa ervato, ut in hydrope originem duxerit, seu a lymphâ, aut recrementis lymphaticis ut in bubone \* ratoride, feu als 196 languine in extremis arteriis partium internarum, aut externarum cunchane a mott febrili, fic apertis cadaveribus corum qui febre malignà variolifique aut morbilis defuneli four, vifera fephacelare obfevantur, fic variolarum puttulas nigrefeentes ut & carbunculos Gangraha concomitatur, sie bubones venereos male tractatos subsequitur; sie febres lentæ colliquativæ partium aquofarum & fubriliorum fanguinis fugâ acrimoniam falfam lymphæ & fanguini inurendo Gangrænam pariunt ut in Ludovico Decimo Quarto', nem febres scorburicæ quæ sæpe in Gangrænam & subsequentem sphacelum degenerant; ut alimenta crashoris succi, fructus crudi acidiotes & austeri sanguinens coagulant ipsiusque circuitum tardant & subdulcem incolem murant in acido-faltum-fixum; fic alimenta falita, acria, piperata, potufque spirituosi & ardentes, sanguinem accendunt & intemperiem calidam tumoresque inflammatorios Gangrænæ prodomos generant: cura & follicitudines animi diversis & inaqualibus cordis pulsationibus & spirituum animalium motibus nunc accelerando circuitum fanguinis, nunc removendo naturalem illius crafim alterant &c intemperiem modo acidam, modo falso - acrem tumoresque modo lymphaticos, modo sanguineos & inflammatorios producunt Gangrænæ fæpe nuntios.

TAM DIÙ fanguis & lympha genninum indolem debitarque temperiem menutu ac fervant, quamdid libere progrediendo in finiosa arceidit & decitubu lymphatisic circuium fuum absiguandid libere progrediendo in finiosa arceidit & decitubu lymphatisic circuium fuum absiguandid libere progressione in the parte fanguins integrantes, globulofe, the parte fanguins integrantes, globulofe, the progressione in the parte forma fanguinis, hine fanguis excrementitis partibus defereaut, hine recrementorum bobbes functionibus vitabbus infervens, unde fanguis nutruur, reparatur, mundafque & integrantes of the parte forma fanguinis, hine fanguis excrementitis partibus defereaut, hine recrementorum respectationibus vitabbus infervens, unde fanguis nutruur, reparatur, mundafque & integrationibus quantum de activitationibus quantum de activitati in minores moleculas, que cum motut trutivo cordis non obleguiste destinationis quantum de activitati in minores moleculas, que cum motut trutivo cordis non obleguiste fanguiste parte diffication a mutuo next relaxata dispunguiri, hice fibre a mutuo

verofum & Gangranofum convertitur, aut fi materies puris moram trahat, falium evelutione excitatur fermentatio putrefactiva, qua & nativus fanguinis calor extinguirur, & pars in frigidum & glaciale corpus abit soluta & exesa fibrarum textura, ergo ad hunc scopum collimandum ut putredinis contagium arceatur & ut corruptum corruptique caufæ tollantur, purrefactique aditus in venas quantocius intercludatur, fic scarificationibus usque ad vivum foncem auferenda causa putredinis proxima, scilicet sanguis harens & stagnans in vasis capillaribus vicine partis ad corruptionem proclivis, & admotis remediis stimulantibus & firmantibus arterias & putredini relistentibus ut acceleretur suppuratio qua destructæ vasorum & carnium fibræ à sanis separentur cum sanguine stagnante; quod si his remediis malum non terminetur, nec index a rain reparent cuit inspute regarding quot in instituents maturi into terrimettr, interpretarioni frippurationis figna appareant, citò cauda Gangrana efficiens cum membro auferenda etiam in majoribus artubus, ut brachio, pede & femore, cum Gangrana ex vitio locali organi à cauda externa exorta freponitur, que operatio ut majoris moliminas et, indultriam & curam fingularem artificis arguit. Sed Gangrana eofdem artus à causa interna obfidens, nec ferro necessitations arguit. igni cedit, altioremque recessium habet & scaturiginem in discrasia sanguinis, in intemperie ejudem, craffitie, falfedine, acrimonià vel vapiditate, qua fanguis ægrè a finibus arteriolis pro-greditur in venas, ideoque vitali motti confervando minimè idoneus; ergo Gangraña ab in-terna causa grafiante non refeiifone brachii aut pedis vita falvabitur, fed malum recrudefeer, & vicinas partes serpendo depascet, tum ex compressione vasorum sanguiserorum per splenia applicata & ligaturam forem amputation praviam ae pedificquam, amminers circulation in faquinis obieve vincesid occurrent, nec aliunde vegetor reddetur vitalis mous abtilifo membro filacelato, nec faquini filodior, nec ilultiloris au diciloris indolis evadet, qui im bi ab amputatione facila fanguinis & virium jactura languidior contractio cordis, & circulationis motus fegnior; hinc fanguis spillior aut acrior & magis effectus, in finibus arteriosis remorabitur. Hinc lentescente magis ac magis arteriarum capillarium contractione, non promovebitur labiorum vulneris fupuratio, nec circulatio fanguinis in vulneracă parte redungerabitur, fed vaforum concidentiă & deperdia fanguinis mout caloreque exincto Gangrama ulterius ferpendo depator, vel imminuto gradatim circulationis moru penitus abolebitur ; ergo faviente Gangrænâ à causa interna de ægrotante concla-\*Hac Thefis mattim eft. \* His gravibus rationum momentis innixi Celeberrimo Medico refiftere conati fumus cum amputandum effe pedem f hacelatum à causa interna pronuntiavit Domino Marchioni de Varenne, Reginæ Hilpaniarum dotariæ helveticorum militum præfecto; sed nescit vox missa reverti ; cum illo fentiente Celeberrimorum Chirurgorum conventu ampuratio cum peritià admi-niftrata fuit, fed irrito labore infaustoque successo, patiensque 30. post horas fato functus est-Præstat igitur & inani parcere dolori ægrum ineluctabili fato suo relinquere, artisque Medica decus & honorem integrum fervare.

Propugnata fuit in Scholis Par, Fræside Erudito Viro Magistro Jo. Besse Dotariæ Hifpan. Reginæ à Confilits & Medico Primario. 2º. Mare. 1738.

Non ergo, ingruente in artus Gangrana à causa interna. amputatio imperanda.

## DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

cietatis Londinensis Socius.

Confiliarius Medicus Regis ordinarius in ejus Castelleto.

M. Andreas Cantwel, Regie So- M. Ludovicus-Alexander Vicillard, M. Joannes-Claudius-Adrianus Helvetius, Rege à Sanctioribus Confiliis , Reginaque Medicus Primarius , & Rigia fcientiarum Academia ficius

M. Benjamin-Ludovicus Lucas de M. Ludovicus - Guillelmus le Mo-Laurembert. nier, è Regià Scientiarum Acadimia & Rei Herbariæ Professor.

M. Jacobus Benignus Winflows Cenfor Regius, Regine Scientiarum Academia, Regiaque Societatis Londinen fis focius, Teutinica Lingua Regius interpres, 14 Horto Regio Anatomes & ChirurgiaProfessor ac Demonstratos's M. Antonius Pepin , Regis Confiliarius & in Portu Erestens

M. Leander Peaget.

M. Josephus - Exuperius Bertin , Supremi Valachie & Moldavie Principis Medicus ordinarius, & Regia Scientiarum Academie Socius.

Medicus Primarius.

Proponebat Pariisiis DIONYSIUS PAUTIER DE LABREULHE, Inculifmensis, Saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parisiensis Baccalaureus, A. R. S. H. 1746. à fextâ ad meridiem.